

Complémentaires aux précautions standard

en cas de grippe, coqueluche, méningite, VRS, BMR en présence d'un prélèvement respiratoire

Ce qui doit être fait	Comment ?
SIGNALEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> - Coller une étiquette (masque, hygiène des mains) sur le dossier patient - Mettre à disposition du patient et de son entourage le support de signalement daté pour la mise en place des précautions « GOUTTELETTES »
CHAMBRE	<ul style="list-style-type: none"> - Renouveler l'air par ouverture fréquente de la fenêtre
MAINS 	Précautions « standard » + Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains après avoir ôté le masque et avant de sortir du domicile du patient
MASQUE et LUNETTES 	<ul style="list-style-type: none"> - Porter un masque de type chirurgical lors de soins effectués au patient ↳ A éliminer dans la filière des ordures ménagères (DAOM = Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères) - Mettre des lunettes de protection, si le geste expose à un risque de projection (précautions standard) - Effectuer une friction hydro-alcoolique après tout retrait de masque et/ou lunettes
GANTS 	Précautions « standard » ↳ A éliminer dans la filière DAOM
SURBLOUSE 	Précautions « standard » + tablier en plastique sur la surblouse pour les soins mouillants ↳ A éliminer <u>à chaque passage</u> dans la filière DAOM
MATERIEL 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser du matériel à usage unique
VAISSELLE 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer la vaisselle de façon habituelle.
DECHETS SPI PT 40 	<u>Pas de gestion particulière des déchets :</u> <ul style="list-style-type: none"> - déchets type DAOM: sac noir en début de soin mettre en place un sac poubelle, le fermer et l'éliminer à la fin du soin dans la filière DAOM du patient - déchets type DASRI : conteneur jaune (En dehors des soins, stocker le carton dans un lieu frais, hors de la portée des enfants et des animaux) Utiliser des mouchoirs en papier ou des crachoirs jetables pour le mouchage et les expectorations
LINGE 	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien habituel - Porter une surblouse et des gants en cas de manipulation de linge sale
ENTRETIEN SPI PT 41 SPI PT 42 	Renforcer le bionettoyage de l'environnement proche du patient : chambre, toilettes, barres de lit, adaptable, poignées ou accoudoirs ... Informer la famille de l'importance de l'entretien de l'environnement du patient
INFORMATION PATIENT-FAMILLE	<ul style="list-style-type: none"> - Informer et éduquer le patient et les proches - Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains en entrant et en sortant de la chambre avec une solution hydro alcoolique - Porter un masque de type chirurgical si contact proche
INTERVENANTS EXTERIEURS-TRANSFERT	<ul style="list-style-type: none"> - Informer les ambulanciers et le service receveur des précautions complémentaires mises en place (fiche de transfert) - Faire porter un masque type chirurgical au patient (ou aux ambulanciers si le patient ne le supporte pas)



PRECAUTIONS « GOUTTELETES »

Etiquette patient

Début d'isolement le :	Fin d'isolement le :
Signature du médecin coordonnateur :	Signature du médecin coordonnateur :

LEVEE DES PRECAUTIONS GOUTTELETES

MENINGITE	24 H après la 1^{ère} injection d'antibiotique
GRIPPE	Jusqu'à guérison clinique
COQUELUCHE	5 jours après le début d'un traitement antibiotique adapté
VRS (Virus Respiratoire Syncytial)	Jusqu'à guérison clinique
BMR	Pendant 1 an à compter de la découverte de la BMR