

Précautions PROFESSIONNEL
Après de patient sans symptôme, au cours de l'épidémie de COVID 19

Surveiller l'apparition chez le patient de :



- symptômes : toux, asthénie, céphalées, hyperthermie
- sensations inhabituelles : perte de goût, perte de l'odorat)

Organisation des soins

Habituelle

Hygiène des mains



Priorité aux solutions hydro alcoolique :

- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants

Masque

Masque chirurgical



1 masque / **patient** / jour
 Chez tous les patients

Le patient porte un masque pour se protéger et protéger les professionnels de santé.

Masque FFP2



Pour les infirmiers/kinés :
Uniquement pour :

- **Les actes invasifs au niveau respiratoire :**
 soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale, aérosol, pleurX ou kiné respiratoire
- **La détersion de plaie avec Jetox**

Pour tous les professionnels pendant les soins dans les 2 heures qui suivent :

Aérosol, VNI 02>6L mn avec masque à haute concentration, MEOPA

A éliminer dans les **DASRI**

Equipement de protection individuelle

Respecter les précautions « **standard** » :

Surblouse +/-tablier étanche **si** soins mouillants ou risque de projection

Gants et lunettes de protection, si risque de contact avec liquide biologique lors des soins dont :

Les actes invasifs au niveau respiratoire :
 soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale, pleurX ou kiné respiratoire

La détersion de plaie avec Jetox