

**Précautions PROFESSIONNEL**  
**Auprès de patient ayant des soins AEROSOLISANTS, avec ou sans**  
**symptôme COVID**

Surveiller l'apparition chez le patient de :



- **symptômes : toux, asthénie, céphalées, hyperthermie**
- **sensations inhabituelles : perte de goût, perte de l'odorat**

**Organisation des soins**

Habituelle

**Hygiène des mains**



Priorité aux solutions hydro alcooliques :

- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants

**Masque**

**Masque chirurgical**



1 masque pour une durée maximale de 4h  
 Chez tous les patients (selon recommandations)

S'il le souhaite, le patient porte un masque pour se protéger et protéger les professionnels de santé.

**Masque FFP2**



**Pour les infirmiers/kinés :**  
**Uniquement** pour :

- **Les actes invasifs au niveau respiratoire :**  
 soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale, aérosol, pleurX ou kiné respiratoire
- **La détersion de plaie avec Jetox**

**Pour tous les professionnels pendant les soins dans les 2 heures qui suivent :**  
 Aérosol, VNI O<sub>2</sub>>6L mn avec masque à haute concentration, MEOPA

A éliminer dans les **DASRI**

**Equipement de protection individuelle**

Respecter les précautions « **standard** » :

**Surblouse +/-tablier** étanche **si** soins mouillants ou risque de projection

**Gants et lunettes de protection, si** risque de contact avec liquide biologique lors des soins dont :

- Les actes invasifs au niveau respiratoire :**  
 soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale, pleurX ou kiné respiratoire
- La détersion de plaie avec Jetox**