

Précautions COMPLEMENTAIRES aux précautions STANDARD

en cas de Covid, grippe, coqueluche, méningite, VRS, BMR retrouvée dans un prélèvement respiratoire
 La mise en place et la levée des précautions se font sur prescription médicale. Vous serez prévenus par l'HAD.

| A FAIRE | COMMENT FAIRE |
|--|--|
| SIGNALER | Prévenir les professionnels par mail de la mise en place des précautions et transmettre en pièce jointe cette fiche technique Mettre à disposition du patient, de son entourage et des professionnels cette fiche technique |
| ENVIRONNEMENT | Aérer régulièrement les pièces de vie |
| HYGIENE DES MAINS  | Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains dans le respect des précautions standard Et surtout après avoir ôté le masque et avant de sortir du domicile du patient |
| MASQUE et LUNETTES  | Porter un masque de type chirurgical lors de soins effectués au patient Mettre des lunettes de protection, si le geste expose à un risque de projection (précautions standard) |
| GANTS  | Mettre des gants à UU si risque de projection (précautions standard) |
| SURBLOUSE  | Mettre une protection de tenue en cas de projection ou soins mouillants (précautions standard) |
| MATERIEL  | Utiliser du matériel à usage unique ou désinfectable |
| VAISSELLE LINGE  | Nettoyer la vaisselle et le linge de façon habituelle. |
| DECHETS  | Pas de gestion particulière des déchets : - déchets type DAOM : sac noir et déchets type DASRI : container jaune Utiliser des mouchoirs en papier ou des crachoirs jetables pour le mouchage et les expectorations |
| ENTRETIEN  | Informer la famille de l'importance de l'entretien de l'environnement du patient Renforcer le bionettoyage de l'environnement proche du patient : chambre, toilettes, barres de lit, adaptable, poignées ou accoudoirs ... |
| INFORMATION PATIENT-FAMILLE | Informer et éduquer le patient et les proches Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains en entrant et en sortant de la chambre Porter un masque de type chirurgical si contact proche |
| INTERVENANTS EXTERIEURS-TRANSFERT | Informers les ambulanciers et le service receveur des précautions complémentaires mises en place (fiche de transfert) Faire porter un masque type chirurgical au patient (ou aux ambulanciers si le patient ne le supporte pas) |